

CERATOSTIGMA willmottianum



Ses feuilles vert foncé sont recouvertes d'un duvet et à l'automne, elles deviennent jaunes. Elles sont finement dentées et bordées de rouge. D'août à novembre, ce petit arbrisseau se couvre de fleurs bleues présentes à l'extrémité des rameaux. Il peut être utilisé pour les massifs, les rocailles, en isolé, pour une bordure. Au besoin, la taille s'effectue au printemps.

caractéristiques du produit :

Saison(s) d'intérêt: été

Saison(s) d'intérêt: automne

Mois de floraison: août

Mois de floraison: septembre

Mois de floraison: octobre

Couleur des fleurs: Bleu vif

Couleur de floraison: bleu

Type de feuillage: caduc

Couleur du feuillage: vert

Couleur du feuillage en automne: rouge

Particularités: floraison longue

Particularités: attire les insectes auxiliaires

Port: arrondi

Port: buissonnant

Hauteur: 50 cm à 1 m

Hauteur à l'âge adulte: 1 m

Largeur: 1 à 1,5 m

Largeur à l'âge adulte: 1,50 m

Utilisation: massif

Utilisation: pot/bac

Utilisation: bord de mer

Utilisation: bordure

Croissance: modérée

Ripaud Pépinières

Exposition: soleil

Résistance au froid: de -15 à -12,2°C

Type de sol: caillouteux

Type de sol: calcaire

Type de sol: sec

Plantation: Planter en sol ordinaire, très bien drainé. Les terres caillouteuses et sèches ne lui font pas peur. Il redoute juste l'humidité stagnante en hiver.

Distance de plantation: 1,50 m

Densité: 1/m²

Nom latin: *Ceratostigma willmottianum*

Nom commun: Ceratostigma de Willmott

Résistance aux maladies: oui

Résistance aux embruns: oui

Résistance à la sécheresse: oui

Alternative au buis: oui

Attire les pollinisateurs: oui